

Объем диспансеризации для мужчин на II этапе в 2019 г.

№	Осмотр, исследование	Примечания
1.	УЗДГ БЦА	В возрасте 45 – 72 года при наличии 3-х факторов риска (повышенное АД 140/90 и выше + повышенный холестерин 5,0 ммоль/л и выше + избыточная масса тела/ожирение ИМТ 25 и выше). В возрасте 65 – 90 лет по рекомендации невролога при впервые выявленном подозрении на перенесенное в анамнезе ОНМК у лиц, не находящихся на «Д» учете поэтому поводу.
2.	Осмотр невролога	В возрасте 65 лет и старше по данным анкетирования: при впервые выявленных двигательных, когнитивных нарушениях и при подозрении на депрессию; при впервые выявленном подозрении на перенесенное в анамнезе ОНМК у лиц, не находящихся на «Д» учете по этому поводу.
3.	Осмотр хирурга/уролога	В возрасте 45, 50, 55, 60, 64 лет при повышенном ПСА более 4нг/мл
4.	Осмотр хирурга / проктолога	В возрасте 40 – 75 года при положительном (+) анализе кала на скрытую кровь, а также по данным анкетирования при отягощенной наследственности по семейному аденоматозу или онкозаболеваниям колоректальной области. По назначению терапевта, гинеколога в случаях выявления симптомов онкозаболевания колоректальной области.
5.	Колоноскопия	По назначению врача-проктолога/хирурга при подозрении на онкозаболевание.
6.	ЭФГДС	По назначению врача-терапевта в случае подозрения на ЗНО пищевода, желудка и 12-ти перстной кишки.
7.	R-графия легких, КТ легких	По назначению врача-терапевта в случае подозрения на ЗНО легких.
8.	Осмотр офтальмолога	В возрасте 40 лет и старше при повышении ВГД выше 21 мм.рт.ст. В возрасте 65 л и старше по данным анкетирования для лиц, имеющих снижение зрения, не поддающееся очковой коррекции.
9.	Спирометрия	По данным анкетирования при подозрении на хронические болезни легких. Курящие граждане по назначению терапевта.
10.	Осмотр ЛОР-врача	По данным анкетирования в 65 лет и старше или по направлению терапевта.
11.	Индивидуальное углубленное или групповое профилактическое консультирование в ОМП/ЦЗ	При впервые выявленных ГБ, ИБС, ЦВБ, атеросклероза сосудов нижних конечностей; по данным анкетирования: курение более 20 сигарет в день, выявленный риск пагубного потребления алкоголя и наркотических средств. В возрасте 65 лет и старше всем в целях коррекции выявленных ФР и(или) профилактики старческой астении. При выявлении высокого ССР, ожирения, повышенный холестерин (8ммоль/л и более).
12.	Осмотр терапевта/ВОП	Установление (уточнение) диагнозов, определение гр. здоровья, гр. «Д» учета, а также направление на дополнительные обследования, не входящие в объем диспансеризации, для получения специализированной мед. помощь (в т. Ч. ВМП), направление на СКЛ.